

Aktuelle Zulassungssituation von Herbiziden nach BVL Zulassungsverzeichnung

Wirkstoff / Handelsname	Naturschutzgebieten, Nationalparks, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen	Wasserschutzgebiet (alle Zonen) und Heilquellenschutzgebiet	GGB (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Bsp: FFH Gebiete))	Gebiete außerhalb dieser Schutzgebiete
Roundup PowerFlex (Glyphosat)	Anwendung verboten	Anwendung verboten	Anwendungsbegründung (notwendiges Maß)! ab 4. Standjahr (max 2 Anwendungen; 3,75l/ha in 100 l bis 400 l/ha Wasseraufwandmenge)	Anwendungsbegründung (notwendiges Maß)! ab 4. Standjahr (max 2 Anwendungen; 3,75l/ha in 100 l bis 400 l/ha Wasseraufwandmenge)
KATANA (Flazasulfuron)	Anwendung verboten	Anwendung möglich ab 4. Standjahr; ab Knospenaufbruch; grüne Triebspitzen werden sichtbar; bei 10-20 cm Unkrauthöhe, April bis Juni	Anwendung möglich ab 4. Standjahr; ab Knospenaufbruch; grüne Triebspitzen werden sichtbar; bei 10-20 cm Unkrauthöhe, April bis Juni	Anwendung möglich ab 4. Standjahr; ab Knospenaufbruch; grüne Triebspitzen werden sichtbar; bei 10-20 cm Unkrauthöhe, April bis Juni
Vorox F (Flumioxazin)	Anwendung verboten	Anwendung möglich nur in Junganlagen und Tafeltrauben	Anwendung möglich nur in Junganlagen und Tafeltrauben	Anwendung möglich nur in Junganlagen und Tafeltrauben
Kerb FLO (Propyzamid)	Anwendung verboten	Anwendung möglich ab 2. Standjahr	Anwendung möglich ab 2. Standjahr	Anwendung möglich ab 2. Standjahr
Belhoukha (Pelagonsäure)	Anwendung verboten	Entfernung von Stockausschlägen Junganlagen; Pflanzjahr bis 4. Standjahr	Entfernung von Stockausschlägen Junganlagen; Pflanzjahr bis 4. Standjahr	Entfernung von Stockausschlägen Junganlagen; Pflanzjahr bis 4. Standjahr
Shark (Carfentrazone)	Anwendung verboten	Entfernung von Stockausschlägen ab 3. Standjahr (nur in wüchsigen Sorten: Grüner Silvaner, Morio Muskat, Chardonnay, Schwarzriesling und Burgundersorten)	Entfernung von Stockausschlägen ab 3. Standjahr (nur in wüchsigen Sorten: Grüner Silvaner, Morio Muskat, Chardonnay, Schwarzriesling und Burgundersorten)	Entfernung von Stockausschlägen ab 3. Standjahr (nur in wüchsigen Sorten: Grüner Silvaner, Morio Muskat, Chardonnay, Schwarzriesling und Burgundersorten)
Quickdown (Pyraflufen)	Anwendung verboten	Entfernung von Stockausschlägen ab 3. Standjahr (nur in den Sorten: Riesling und Dornfelder)	Entfernung von Stockausschlägen ab 3. Standjahr (nur in den Sorten: Riesling und Dornfelder)	Entfernung von Stockausschlägen ab 3. Standjahr (nur in den Sorten: Riesling und Dornfelder)

Stand: 16.03.2023 - keine Gewähr auf Vollständigkeit!

Darstellung: Dezernat Weinbau V 51.2, Team Beratung